八戸市南郷新規作物研究会議
令 和 元 年　12 月　24 日

1　令和元年産ワイン用ぶどうについて

品種名	収穫量 (kg)	単収 (kg/10a)	平均糖度※ (Brix 値)	収穫期	
				9 月	10 月
ピノ・ノワール	259	324	20		上
マスカット・ベーリーA	3,403	1,702	18		中
メルロー	210	105	21		上
ケルナー	418	837	20	下	
シャルドネ	286	197	19		上
キャンベル・アーリー	2,674	822	17	中	上中
デラウェア	170	170	20	中	
ナイアガラ	1,341	1,341	17		上
ポートランド	737	1,053	16	中下	
ブラッククイーン	9	13	15		中
ヤマ・ソービニオン	18	24	17		中
合計・平均	9,524	708	18		

※平均糖度：果実糖度と果汁糖度の平均値

2　ワイン用ぶどうの収穫量等の推移について

（1）収穫量　（単位　kg）

品種名	平成 29 年産	平成 30 年産	令和元年産
ピノ・ノワール	133	150	259
マスカット・ベーリーA	1,547	1,137	3,403
メルロー	170	456	210
ケルナー	156	229	418
シャルドネ	20	100	286
キャンベル・アーリー	150	1,413	2,674
デラウェア	48	154	170
ナイアガラ	526	693	1,341
ポートランド	－	411	737
ブラッククイーン	3	－	9
ヤマ・ソービニオン	－	－	18
合計	2,753	4,743	9,524

（２）単収　　（単位　kg/10a）

品種名	平成 29 年産	平成 30 年産	令和元年産
ピノ・ノワール	166	188	324
マスカット・ベーリーＡ	774	758	1,702
メルロー	170	228	105
ケルナー	312	229	837
シャルドネ	100	100	197
キャンベル・アーリー	100	662	822
デラウェア	48	154	170
ナイアガラ	554	527	1,341
ポートランド	－	1,370	1,053
ブラッククイーン	4	－	13
ヤマ・ソービニオン	－	－	24
平均	316	415	708

（３）平均糖度　　（単位　Brix 値）

品種名	平成 29 年産※1	平成 30 年産※2	令和元年産
ピノ・ノワール	20	15	20
マスカット・ベーリーＡ	17	19	18
メルロー	21	19	21
ケルナー	20	17	20
シャルドネ	19	19	19
キャンベル・アーリー	17	17	17
デラウェア	20	21	20
ナイアガラ	19	19	17
ポートランド	－	11	16
ブラッククイーン	17	－	15
ヤマ・ソービニオン	－	－	17
平均	19	17	18

※１　平成 29 年産：果実糖度

※２　平成 30 年産：果汁糖度

3　今後のワイン用ぶどう生産について

年月	生育相	内容
2年 1月	休眠	・ワイン用ぶどうの収穫量等に関するデータをワイン用ぶどう生産経営体及び市内ワイナリーへ提供。
2月		・今後のワイン用ぶどうの生産について、ワイン用ぶどう生産経営体及び市内ワイナリーに対してヒアリング。
3月		・ワイン用ぶどう生産経営体、市内ワイナリー及び市において、今後のワイン用ぶどうの生産に関する検討。
4月	萌芽 展葉	ワイン用ぶどう生産経営体の収益性の向上を図るため、令和2年度第1回八戸市ワイン用ぶどう生産講習会開催。
5月		
6月	開花 結実 肥大	令和2年度第2回八戸市ワイン用ぶどう生産講習会開催。
7月		
8月		令和2年度第3回八戸市ワイン用ぶどう生産講習会開催。
9月	成熟	
10月		
11月	落葉	令和2年度第4回八戸市ワイン用ぶどう生産講習会開催。
12月	休眠	